

**Рекомендации о транспортировке, применении,
хранении агрохимиката, о его обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении
для СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**

АЗОФИТ

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ, РОСТА И
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ, УСКОРЕНИЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ**

ТУ 9291-001-50752923-2006

Свидетельство о государственной регистрации № 397-19-1260-1 (ООО «Фитапром»)
4 класс опасности (малоопасный агрохимикат)

1. Ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката

При работе и транспортировании, необходимо руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Транспортирование осуществляют всеми видами транспорта в крытых, сухих, чистых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на данном виде транспорта. Не допускается совместное транспортирование с продуктами питания, использование транспортных средств, ранее применявшихся для перевозки ядохимикатов. Хранить отдельно от пищевых продуктов, питьевой воды, в местах недоступных для детей и животных.

2. Мероприятия по оказанию первой помощи при отравлении агрохимикатом

При попадании в глаза: промыть мягкой струей чистой проточной воды.

При попадании на кожу: вымыть загрязненные места водой с мылом.

При попадании через органы дыхания: вывести пострадавшего на свежий воздух.

При случайном проглатывании препарата следует вызвать рвоту, дать выпить несколько стаканов воды. При необходимости – обратиться к врачу.

3. Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении агрохимиката

При приготовлении рабочего раствора и применении соблюдать общие требования безопасности и личной гигиены. Обработку проводить в хлопчатобумажном халате или комбинезоне, марлевой повязке или респираторе, в резиновых перчатках и защитных очках. Для приготовления рабочих растворов нельзя использовать посуду для пищевых продуктов и питьевой воды. Во время работы нельзя принимать пищу, пить, курить. После работы руки и лицо вымыть с мылом.

4. Технология применения и таблица регламентов применения агрохимиката

Предпосевную обработку семян зерновых культур, картофеля рекомендовано проводить в протравливателях марок ПСШ-5, ПС-10А, «Мобитокс-супер», ПС-30, КПС-10, КПС-20, КПС-40, ПУМ-30, УМОП-30, УМОП-20, ПКМ-140, ПКС-20 и др. машин и агрегатов для протравливания семян, при небольших объемах возможно использование бетономешалок. Семена овощных культур замачивают в стеклянной, эмалированной, полиэтиленовой посуде, а также в емкостях, изготовленных из нержавеющей стали.

Корневые подкормки растений водным раствором удобрения рекомендовано проводить через различные системы (капельный полив, дождевальные установки и др.). Для проведения некорневой подкормки растений рекомендовано использовать любые серийно выпускаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ -2000, ОПУ 1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18, ОПГ-2500-18-05Ф, ОПГ-2500-24-05Ф, SLV-2000 R и др.).



Перед применением удобрения необходимо перемешать. Для приготовления рабочего раствора в бак протравливателя, поливочной системы или опрыскивателя наливают хлорированную воду на 2/3 объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество удобрения, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят обработки. Рабочий раствор готовят непосредственно перед обработкой. Объем приготовляемых рабочих растворов должен соответствовать предполагаемому объёму работ с целью исключения остатков неиспользованных растворов.

Обработанные семена необходимо оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Опрыскивание вегетирующих растений проводят в утренние и вечерние часы в безветренную погоду или при скорости ветра 4-5 м/сек. и температуре воздуха 18-22°C.

Регламенты применения Азофит® для сельскохозяйственного производства (СХ)

Культура	Норма применения	Время, особенности применения
Зерновые культуры	1 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Предпосевная обработка семян
	1 л/га Расход рабочего раствора 300-400 л/га	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза
Картофель	1,0 л/т Расход рабочего раствора – 10 л/т	Обработка посадочных клубней
	1,0 л/га Расход рабочего раствора – 1000 л/га	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза
Овощные культуры	10-20 мл/л воды	Замачивание семян перед посевом на 24 часа
	1 л/га Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-4 раза (внесение с поливными водами)

5. Об обезвреживании, утилизации, уничтожении, захоронении пришедшего в негодность агрохимиката, а также тары из-под него

Все мероприятия по обезвреживанию тары, пролитых препаратов, транспортных средств и агрохимиката, пришедшего в негодность, необходимо проводить на открытом воздухе, на специально оборудованных площадках, с использованием средств индивидуальной защиты.

Отходы (остатки) препарата, освободившаяся тара, подлежат сбору и вывозу на полигоны бытовых и промышленных отходов или в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.

Индивидуальные средства защиты (халат, перчатки, фартук) стирают с применением моющих средств.



Изготовление и расфасовка (по лицензионному договору с ООО «Фитапром») ООО ПО «Сиббиофарм» ОГРН 1035404721780. Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д.11. Телефон: +7 (383) 304 70 00, e-mail: sibbio@sibbio.ru www.sibbio.ru **Регистрант** ООО «ФИТАПРОМ» ОГРН 1025404725224, 633004 Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 9/4, тел. 8-383-415-80-83, 8-383-415-80-93

